

---

# Lékaři provedli oddělení dolní části těla od horní

---

## Lékaři provedli oddělení dolní části těla od horní

Roman PISTORIUS, moderátor

Někdy dřív se neviděli, teď se potkali. Dva muži po stejném operačním zákroku. Seznámil je tým lékařů z pražské Bulovky, který právě jim jako prvním pacientům v republice oddělil dolní polovinu těla.

Barbora SUDOVOÁ, redaktorka

Robert a Mirek byli až doteď cizí lidé, které ale spojuje stejný osud. Jako jediní dva v republice podstoupili náročnou amputaci, při které jim lékaři odstranili dolní polovinu těla. K takto radikálnímu řešení přistupují lékaři jen u pacientů s vážnými komplikacemi.

František BARTOŠ, přednosta, Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

To znamená především proleženiny, dekubity, které se infikují a které de facto toho pacienta přivedou až na samý kraj života.

Barbora SUDOVOÁ, redaktorka

Roberta Kypěnu operovali lékaři před sedmi lety. Narodil se s poruchou míchy a páteře. Po letech na vozíku dostal otravu krve.

Robert KYPĚNA

Měl jsem dvě šance, buď budu žít s tímhle handicapem anebo zemřu. A tak že jsem se rozhodl pro to, že budu žít.

Barbora SUDOVOÁ, redaktorka

Pětatřicetiletý Mirek zůstal po nehodě na vozíku, operaci podstoupil stejně jako Robert kvůli těžkým proleženinám.

Miroslav HOLUB

Operace mě osvobodila od všech bolestí a všech trápení, protože, jak jsem měl ty dekubity, tak na základě toho jsem musel dělat pětkrát denně převazy, pětkrát denně ve vaně.

Barbora SUDOVOÁ, redaktorka

Amputace je náročná a riskantní. Lékaři musejí mimo jiné vytvořit umělý vývod z tlustého střeva a močového měchýře.

František BARTOŠ, přednosta, Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Pak je velmi náročná ta část plastická, to musíme de facto najít kůži a svalstvo k tomu, abychom pokryly celý ten defekt, který vlastně vytvoříme.

Barbora SUDOVOÁ, redaktorka

Na celém světě provedli lékaři jen čtyřicet osm takových úspěšných amputací. Vůbec poprvé se hemiorporectomie podařila v roce 1961 chirurgickému týmu z USA.